

分類	感染症名 Disease Name	出席停止期間 Period of suspension of school-attendance
第一種 Class 1	エボラ出血熱 (Ebola hemorrhagic fever)	治癒するまで Until cured.
	クリミア・コンゴ出血熱 (Crimean-Congo hemorrhagic fever)	
	痘そう (Smallpox)	
	南米出血熱 (South American hemorrhagic fever)	
	ペスト (Plague)	
	マールブルグ病 (Marburg disease)	
	ラッサ熱 (Lassa fever)	
	急性灰白髄炎 (Acute poliomyelitis)	
	ジフテリア (Diphtheria)	
	重症急性呼吸器症候群 (ヘーテコウイルス属 SARS コロナウイルス) (Severe acute respiratory syndrome)	
	中等呼吸器症候群 (ヘーテコウイルス属 MERS コロナウイルス) (Middle East respiratory syndrome)	
	特定鳥インフルエンザ (Avian influenza infection)	
	新型インフルエンザ等感染症 (Novel Influenza Infection)	
指定感染症 (Designated infectious disease)		
新感染症 (New infectious disease)		
第二種 Class 2	インフルエンザ (鳥インフルエンザ (H5N1) を除く) (Influenza (excluding avian influenza and a Novel Influenza Infection, etc.))	発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで Five days subsequent to the day of the appearance of symptoms, plus two more days subsequent to that of the disappearance of fever.
	百日咳 (pertussis)	特有の咳が消失するまで、又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで Until the distinctive cough disappears, or 5 days of appropriate antibiotic treatment have been completed.
	麻疹 (はしか) (measles)	解熱した後 3 日を経過するまで Until 3 days have passed after the disappearance of fever.
	水痘 (水ぼうそう) (chickenpox)	すべての発疹が痂皮化するまで Until all blisters have scabbed over.
	風しん (三日ばしか) (Rubella)	発疹が消失するまで Until the rash disappears.
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) (Mumps)	耳下腺、顎下腺または舌下腺腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで Until 5 days have passed since the onset of swelling in the parotid glands, submaxillary glands or sublingual glands, and overall condition has improved.
	咽頭結膜熱 (プール熱) (Pharyngoconjunctival fever)	主症状が消退した後 2 日を経過するまで Until 2 days have passed following the day on which major symptoms disappear.
	結核 (Tuberculosis)	医師が感染のおそれがないと認められるまで
	髄膜炎 菌性髄膜炎 (Meningococcal meningitis)	Until a physician judges the patient's condition to be noninfectious.
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで Five days subsequent to the day of the appearance of symptoms, plus a day beginning on the day after that on which overall condition is judged by qualified medical personnel to have improved.	
第三種 Class 3	コレラ (Cholera)	医師が感染のおそれがないと認めるまで Until a physician determines the condition to be noninfectious.
	細菌性赤痢 (Shigellosis)	
	腸管出血性大腸菌感染症 (Enterohemorrhagic Escherichia coli infection)	
	腸チフス (Typhoid fever)	
	パラチフス (Paratyphoid fever)	
	流行性角結膜炎 (Epidemic keratoconjunctivitis)	
	急性出血性結膜炎 (Acute hemorrhagic conjunctivitis)	